

MMR

مرض الحصبة في انتشار

كانت هناك مؤخرًا حالات مؤكدة لمرض الحصبة في مدينة بيرري. وهذا المرض شائع أيضًا في العديد من البلدان الأخرى التي هي وجهات السفرات السياحية. الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

التطعيمات متوفرة

تستمر العيادات الملحقة (Catch-up Clinics) خلال شهر تموز / يوليو بالتطعيم لأي شخص يتراوح عمره بين 1 و18 عامًا فاتته جرعة اللقاح الثلاثي (MMR) لأي سبب من الأسباب.

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لمعرفة التواريخ والموقع لأقرب عيادة ملحقة. يمكن تحديد المواعيد عن طريق الاتصال بطبيبك العام (GP).



إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان طفلك قد فاتته اللقاح الثلاثي، فيمكنك مراجعة عيادة طبيبك العام. سنتواصل عيادة طبيبك العام واتحاد أطباء بيرري أيضًا بأولياء أمور الأطفال الذين تُظهر سجلاتهم الطبية أنهم قد فاتتهم جرعة اللقاح الثلاثي.

تتوفر لقاحات خالية من جيلاتين الخنازير. إذا كنت تفضل لقاحًا بدون جيلاتين الخنازير، فيرجى إبلاغ العيادة بذلك.